

湘南鎌倉総合病院 乳癌レジメン一覧 (2020.3月)

術前・(周術期)					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
CMF	28日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	メソトレキセート	40mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	600mg/m ²
TC	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
EC	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	エピルビシン	90mg/m ²
AC	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ドキシソルビシン	60mg/m ²
FEC100	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	500mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	500mg/m ²
		点滴静注	Day 1	エピルビシン	100mg/m ²
dd-AC	14日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ドキシソルビシン	60mg/m ²
TCH	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
		点滴静注	Day 1	パラプラチン	AUC:6
		点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
weekly PAC	7日	点滴静注	Day 1	パクリタキセル	80mg/m ²
DOC75	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
weekly PAC+Trastuzumab	7日	点滴静注	Day 1	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
DOC75+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
Pertuzumab+Trastuzumab+DOC	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	840mg/body(初回)、420mg/body(2回目以降)
Pertuzumab+Trastuzumab+PAC	21日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	840mg/body(初回)、420mg/body(2回目以降)
Pertuzumab+Trastuzumab維持	21日	点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	6mg/kg
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	420mg/body
triweekly Trastuzumab維持	21日	点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)

進行・再発					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
weekly PAC+Bevacizumab	28日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	90mg/m ²
		点滴静注	Day 1・15	ベバシズマブ	10mg/kg
AC	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ドキソルビシン	60mg/m ²
EC	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	600mg/m ²
		点滴静注	Day 1	エピルビシン	90mg/m ²
FEC60	21日	点滴静注	Day 1	シクロホスファミド	500mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	500mg/m ²
		点滴静注	Day 1	エピルビシン	60mg/m ²
DOC	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	60mg/m ²
weekly PAC	28日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
GEM+PAC	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1250mg/m ²
		点滴静注	Day 1	パクリタキセル	175mg/m ²
VNR	21日	点滴静注	Day 1・8	ビノレルビン	25mg/m ²
GEM	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1250mg/m ²
Eliburin	21日	点滴静注	Day 1・8	エリブリン	1.4mg/m ²
Pertuzumab+Trastuzumab+DOC	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	75mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	840mg/body(初回)、420mg/body(2回目以降)
Pertuzumab+Trastuzumab+PAC	21日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	840mg/body(初回)、420mg/body(2回目以降)
Capecitabine+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
		投薬	Day 1-14	カペシタビン	2500mg/m ²
GEM+PAC+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1250mg/m ²
		点滴静注	Day 1	パクリタキセル	175mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
DOC+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	60mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
T-DM1	21日	点滴静注	Day 1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg
Pertuzumab+Trastuzumab維持	21日	点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1	ペルツズマブ	840mg/body(初回)、420mg/body(2回目以降)
triweekly Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
VNR+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1・8	ビノレルビン	25mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
weekly PTX+Trastuzumab	28日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15・22	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
GEM+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1250mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15	トラスツズマブ	4mg/kg(初回)、2mg/kg(2回目以降)
Eribulin+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day 1・8	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		点滴静注	Day 1・8	エリブリン	1.4mg/m ²
Fulvestrant	28日	筋注	Day 1	フルベストラント	500mg/body(導入時のみday14にも投与)
(閉経後) Palbociclib+Fulvestrant	28日	筋注 内服	Day 1 Day 1-21	フルベストラント パルボシクリブ	500mg/body(導入時のみday14にも投与) 125mg/body
(閉経前) Palbociclib + Fulvestrant + LH-RHa Palbociclib+Fulvestrant+LH-RHa	28日	筋注 内服	Day 1 Day 1-21	フルベストラント パルボシクリブ	500mg/body(導入時のみday14にも投与) 125mg/body
Atezolizumab+nabPAC	28日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m ²
		点滴静注	Day 1・15	アテゾリズマブ	840mg/body

- Pertuzumab、Trastuzumab、T-DM1はHER2陽性乳癌にのみ使用
- FulvestrantはLuminalタイプ乳癌に使用
- PalbociclibはLuminalタイプかつHER2陰性乳癌にのみ使用