

湘南鎌倉総合病院 大腸癌レジメン一覧 (2020.3月)

術後補助					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
CAPOX	21日	点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day 1-14	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回
mFOLFOX6	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	85mg/m ²
進行・再発					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量
mFOLFOXIRI + Bevacizumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		持続静注	Day 1	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	5mg/kg
mFOLFOX6 + Bevacizumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	5mg/kg
CAPOX + Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		内服	Day 1-14	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回
FOLFIRI + Bevacizumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	5mg/kg
IRIS + Bevacizumab	28日	点滴静注	Day 1・15	イリノテカン	125mg/m ²
		点滴静注	Day 1・15	ベバシズマブ	5mg/kg
		内服	Day 1-14	エスワン	80mg/m ² /日 1日2回

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量
sLV5FU2+Bevacizumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	5mg/kg
Capecitabine+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		内服	Day 1-14	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回
SOX+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		内服	Day 1-14	エスワン	80mg/m ² 1日2回
FOLFIRI+Ramucirumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day 1	ラムシルマブ	8mg/kg
mFOLFOX6+Panitumumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day 1	パニツムバブ	6mg/kg
FOLFIRI+Panitumumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day 1	パニツムバブ	6mg/kg
IRIS+Panitumumab	28日	点滴静注	Day 1・15	イリノテカン	100mg/m ²
		点滴静注	Day 1・15	パニツムバブ	6mg/kg
		内服	Day 1-14	エスワン	40mg/m ² /回 1日2回
FOLFIRI+Cetuximab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量
sLV5FU2+Panitumumab	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	パニツムバブ	6mg/kg
IRIS+Cetuximab	28日	点滴静注	Day 1・15	イリノテカン	125mg/m ²
		点滴静注	Day 1・8・15・22	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
		内服	Day 1-14	エスワン	80mg/m ² /日 1日2回
CPT-11+Cetuximab	28日	点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg
		点滴静注	Day 1・8	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
sLV5FU2	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
SOX	21日	点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day 1-14	エスワン	80mg/m ² 1日2回
CAPOX	21日	点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day 1-14	カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回
FOLFIRI	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
IRIS	28日	点滴静注	Day 1・15	イリノテカン	125mg/m ²
		内服	Day 1-14	エスワン	80mg/m ² /日 1日2回
mFOLFOX6	14日	点滴静注	Day 1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day 1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day 1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day 1	オキサリプラチン	85mg/m ²
CPT-11	14日	点滴静注	Day 1	イリノテカン	150mg/m ²
Panitumumab	14日	点滴静注	Day 1	パニツムバブ	6mg/kg
Cetuximabuximab	7日	点滴静注	Day 1	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg
Pembrolizumab	21日	点滴静注	Day 1	ペムブロリズマブ	200mg